



4

¿CÓMO ES QUE LOS PACIENTES PUEDEN USAR DOXY-PEP CONTRA ITS?

- La doxiciclina es una píldora que está disponible únicamente por prescripción.
- Es ideal tomar 200 mg. de doxiciclina en un periodo de 24 horas pero no mayor a 72 horas después de haber tenido sexo oral, anal, o vaginal sin protección.
- La doxiciclina se puede tomar a diario, dependiendo de la frecuencia de la actividad sexual, pero los pacientes no deben de tomar más de 200 mg. en un periodo de 24 horas.



5

¿QUÉ NECESITO SABER SOBRE LA DOXICICLINA COMO DOXY-PEP COMO TRATAMIENTO A ITS?

Los pacientes que utilicen la doxy-PEP contra ITS deberán de mantener una rutina regular de prueba para mantener su salud sexual, incluyendo pruebas cada 3 meses para la gonorrea, clamidia, sífilis, y VIH (si no sabe que tiene VIH.) Si la persona que está usando doxy-PEP es diagnosticada con ITS, deberán de ser tratados de acuerdo a las guías establecidas* por 2021 CDC STI.

*Encuentre la guía aquí:

cdc.gov/std/treatment-guidelines/default.htm



6

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA DOXICICLINA?

Además de informar a los pacientes sobre los beneficios preventivos de tomar doxiciclina como STI PEP, los proveedores deberán de informar a los pacientes sobre posibles efectos secundarios incluyendo, **fototoxicidad, síntomas gastrointestinales, y ulceración esofágica.**



7

¿CÓMO PUEDO CONCIENTIZAR SOBRE DOXY-PEP CONTRA ITS?

Es conocida como un medicamento que tiene varios años, sin embargo se le considera como una nueva intervención. Organizadores comunitarios, proveedores, y DIS necesitan que tomar una perspectiva proactiva para informar a pacientes sobre la doxy-PEP contra ITS. Considere una campaña de concientización a miembros comunitarios, socios comunitarios, para construir concientización entre la población, además de considerar el trabajar con proveedores y farmacias que pueden informar sobre el medicamento y así vencer cualquier barrera.